

# TIPOS DE COLOSTOMÍAS

@Creative\_Nurse


Apertura quirúrgica del colon a la piel para la eliminación del tránsito intestinal y/o desobstrucción del intestino grueso.

Las estomas son realizados frecuentemente en la práctica clínica y comunes en enfermedades de origen intestinal.

Una colostomía puede ser de corta duración (temporal) o de por vida (permanente).

En función de la porción abocada será: ascendente, transversa, descendente o sigmoide.


## COLOSTOMÍA ASCENDENTE



En este procedimiento, solamente una parte del colon aún funciona. Como resultado, se absorbe poca agua del excremento.

Poco frecuente, en general suelen sustituirse por una ileostomía.

## COLOSTOMÍA TRANSVERSA




### COLOSTOMÍA DE BOCA ÚNICA

Esta cirugía extirpa el colon por debajo de la colostomía, incluido el recto y la apertura anal. Este tipo de colostomía es permanente.


### COLOSTOMÍA EN ASA

En este tipo, el colon permanece conectado al recto. Como resultado, las personas, en ocasiones, eliminan las heces o los gases a través del recto.




### COLOSTOMÍA DE DOBLE BOCA

Esta divide el colon en dos extremos que forman estomas separados. Las heces salen por uno de los estomas. El moco fabricado por el colon sale por el otro. Este tipo de colostomía transversa es la menos frecuente.




## COLOSTOMÍA DESCENDENTE



Las heces normalmente son firmes porque se han trasladado a través de las partes funcionales del colon.

## COLOSTOMÍA SIGMOIDEA



Este es el tipo más frecuente.

Las colostomías sigmoideas producen heces más sólidas y regulares que otras colostomías.