

Tincions intrínseques



Tipus tinció: Per material d'odontologia restauradora (amalgama d'argent)

Origen: Posteruptiva

Afectació: Localitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per material d'odontologia restauradora (compòsit)

Origen: Posteruptiva

Afectació: Localitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per dentinogènesi imperfecta

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per ingesta de fluorurs, *fluorosi dental greu*

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per necrosi polpar

Origen: Posteruptiva

Afectació: Localitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: Sí està indicat



Tipus tinció: Per administració de tetraciclines, grau III

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per patologia dental, *càries*

Origen: Posteruptiva

Afectació: Localitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No està indicat



Tipus tinció: Per dentinogènesi imperfecta

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per amelogènesi imperfecta, *forma hipomadurativa*

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per administració de tetraciclines, grau IV

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per amelogènesi imperfecta, *forma hipoplàsica*

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per material d'odontologia restauradora
(endodòncia)

Origen: Posteruptiva

Afectació: Localitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: Sí indicat



Tipus tinció: Per patologia dental, *càries*

Origen: Posteruptiva

Afectació: Localitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No està indicat



Tipus tinció: Per amelogènesi imperfecta, *forma hipomineralitzada*

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Tipus tinció: Per administració de tetraciclines, grau I/II

Origen: Preeruptiva

Afectació: Generalitzada

Tractament eliminació tinció dental intrínseca: No indicat



Necessito un blanquejament dental intrínsec!