

SONDATGE RECTAL

- Tècnica que consisteix en la introducció d'un catèter rectal a través de l'esfínter anal fins al recte.
- Catèter: sonda rectal:



Ø en French. Per adults 22-30 French

Docent: Daniel Andreu

SONDATGE RECTAL

Indicacions

- Per alleugerar la distensió abdominal causada per la retenció de gasos
- Per l'administració d'ènemes.

Complicacions

- Molèsties al pacient
- Ansietat
- Perforació intestinal

Contraindicacions

- Pacients acabats d'intervenir del recte, pròstata o patologia rectal.
- Peritonitis.
- Apendicitis.
- Traumatismes abdominals.
- Inflamació intestinal.
- Inestabilitat cardíaca. (per estimulació vagal: hipotensió i bradicàrdia)

Docent: Daniel Andreu

Equips d'irrigació



cànula

Ènema comercial preparat




Ènema de pera / goma




Es pot escalfar al microones
Ja està lubricada, però lubricar més

Docent: Daniel Andreu

ÈNEMA:




- Procediment per introduir líquids al recte i colon a través de l'anus.
- **EVACUANT/ NETEJA:** 500ml-1L. **Retenció 5-10 min**
 - Aigua sabonosa
 - Ènema salí: 2 culleres de sal dissoltes a l'aigua.
 - Ènemes comercials: fosfat sòdic.
- **RETENCIÓ:** 100-500ml. **Retenció 20-30min**
 - **OLIÓS:** oli d'oliva amb aigua.
 - **MEDICAMENTÓS**
 - ANTIHELMINTIC
 - ANTISÈPTIC
 - ANTIPIRÈTIC
 - CARMINATIU: expulsa gasos
 - BRONCODILATADORS
 - ESTIMULANT (laxant)
 - Etc.
 - **OPAC:** per realitzar radiografies. Conté sulfat de bari.



Docent: Daniel Andreu

PROTOCOL ÈNEMA DE NETEJA

- Preparació/Rentat mans i guants /Explicació/ Intimitat...
- Valorar constants vitals




DLE/SIMS ESQUERRE | **xopador**

37-38(40)°C
¼ -1 L
PURGAR!!!!

30-50cm

Separar natges amb la mà no dominant
Introduir sonda (22-24Fr) direcció melic
10cm adult/ 5cm nens
Ha de respirar lenta i profundament
Si hemorroides: que realitzi esforç de defecar
Si l'entrada ènema s'alenteix, rotar la sonda
No forçar




- Retenir-ho 10 minuts.
- Retirar-ho (ha de respirar lenta i profundament)
- Higiene (si és necessari)
- Acomodar
- Recollir
- Registrar: tolerància del pacient, característiques i quantitat de líquid i femta evacuada.

Docent: Daniel Andreu

PROTOCOL SONDATGE RECTAL AMB RESERVORI


- Preparació/Rentat mans i guants /Explicació/ Intimitat...
- Valorar constants vitals



DLE/SIMS ESQUERRE | **xopador**

Lubricar 5cm

Separar natges amb la mà no dominant
Introduir sonda (22-24Fr) direcció melic
10cm adult/ 5cm nens
Ha de respirar lenta i profundament
No forçar
Si hemorroides: que realitzi esforç de defecar



- Fixar-ho amb esparadrap i retenir-ho 20-30 minuts.
- Retirar-ho (ha de respirar lenta i profundament)
- Higiene (si és necessari)
- Acomodar
- Recollir
- Registrar

Docent: Daniel Andreu